




ACTUALIZACIÓN EN LAS GUÍAS DE DIAGNÓSTICO, MONITORIZACIÓN Y TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

26 de julio 2012

El objetivo de esta actividad es:


Difundir las recomendaciones del MSP para uniformizar criterios diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento y optimizar los recursos para el logro de una atención integral de calidad, equitativa y universal de las Personas con VIH, usuarios/as del SNIS.

Programa:

Horario	Actividad	Responsables
11:00-11:30	Bienvenida. Situación epidemiológica del VIH	Dra. Susana Cabrera
11:30-11:45	Diagnóstico. Estrategias: 1) prueba iniciada por el usuario; 2) prueba iniciada por el proveedor de salud Indicaciones de la prueba	Dra. Zaida Arteta
11:45-12:15	TAR de inicio. 1) Indicaciones; 2) planes	Dra. Daniela Paciel
12:15-12:30	Preguntas, comentarios	
12:30-12:45	Cuando cambiar el TAR	Dra. Susana Cabrera
12:45-13:00	Preguntas, comentarios. Cierre	


Tasa de Notificación de VIH-Sida/año

Uruguay. 1991-2011





Tasa de Muerte por Sida/año, global y distribuida por sexo Uruguay. 1991-2010


Media de edad: 43 años




Tasa de notificación de VIH por 100.000 habitantes según departamento. 2011



Evolución en la relación H/M en la notificación de VIH y Sida




Distribución de casos de VIH notificados según edad y sexo. 2011



Mediana de edad - mujeres: 35 años


- varones: 36 años

Distribución de casos notificados según sexo y vía de transmisión. 2011





44% de los casos notificados NO consta la vía de transmisión!!!



Completar el formulario de notificación aporta conocimiento esencial de la epidemia y sus tendencias

NIVEL DE EDUCACION DEL PACIENTE			
No tiene estudios () Primaria: Incompleta () / completa () Secundaria: Incompleto ()/completo ()			
Estudios Terciarios: Incompletos () / completos ()			
Motivación del examen (puede ser más de una):			
Iniciativa propia: () Indicación médica: () Sintomático: () Control de embarazo: ()			
Contacto con caso: () Otra ITS: () Control trabajo sexual: () Accidente laboral: ()			
Donación de sangre/organos/fluidos: ()			
Via probable de transmisión			
Sexual ()	Heterosexual ()	HSH ()	Bisexual ()
Sanguíneo ()	Transfusión ()	UDI ()	Accidente ()
Vertical ()			

http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_5259_1.html .




Elevada tasa de transmisión vertical en el subsector público

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total de partos	74	89	86	72	69	71
Total de VIH +	3	2	5	3	3	5
Tasa de TV	4.1	2.4	6.2	4.5	4.8	7^(*)

(*) 1 caso de TV por lactancia en el 2011




Diagnóstico tardío en Uruguay






Cobertura de Tratamiento Antirretroviral






Número de Personas con TB-VIH y que reciben TAR



Objetivos:

-  Promover el diagnóstico temprano
-  Inicio precoz de la TAR
-  Reducir la tasa de transmisión vertical



-  REDUCIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH
-  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
-  PROLONGAR LA EXPECTATIVA DE VIDA